

Resultaten enquête van *Medisch Contact*  
en *NCRV - Altijd Wat* over palliatieve sedatie  
in de huisartsenpraktijk

10 december 2013

[www.medischcontact.nl](http://www.medischcontact.nl)

[www.altijdwat.ncrv.nl](http://www.altijdwat.ncrv.nl)

**MEDISCH  
CONTACT**



	Total	
Heeft u wel eens palliatieve sedatie toegepast?	Percentage	Number
Ja	91%	791
Nee	9%	75
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

	Total	
Met welke strategie bent u begonnen bij uw MEEST RECENTE geval van palliatieve sedatie?	Percentage	Number
Tijdelijke/intermitterende sedatie	32%	256
Diepe en continue sedatie	66%	521
Anders, namelijk	2%	14
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

	Total	
Welk(e) middel(en) heeft u daarbij gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)	Percentage	Number
Midazolam (Dormicum®)	98%	774
Levomepromazine (Nozinan®)	7%	56
Diazepam (Valium®)	1%	9
Lorazepam (Temesta®)	1%	6
Clonazepam (Rivotril®)	1%	5
Propofol (Diprivan®)	0%	0
Morfine	59%	463
Anders, namelijk	4%	30
<b>Total</b>	<b>170%</b>	<b>1343</b>

	Total	
Heeft u uw beleid gedurende het verloop van deze palliatieve sedatie veranderd?	Percentage	Number
Nee, ik heb mijn beleid niet veranderd	77%	608
Ja, ik ben overgegaan tot tijdelijk/intermitterend sederen	1%	5
Ja, ik ben overgegaan tot diep en continue sederen	19%	151
Anders, namelijk	3%	27
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

Hoe lang heeft de patiënt nog geleefd na de start van deze palliatieve sedatie?	Total	
	Percentage	Number
Minder dan 2 dagen	47%	368
Tussen 2 en 7 dagen	47%	372
1 tot 2 weken	4%	30
2 weken tot een maand	0%	3
Langer dan een maand	1%	4
Weet niet	2%	14
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

Bent u <i>wel eens</i> begonnen met palliatieve sedatie terwijl er nog geen onbehandelbare symptomen waren?	Total	
	Percentage	Number
Ja	7%	57
Nee	92%	725
Dat wil ik niet zeggen	1%	9
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

Heeft u bij palliatieve sedatie een patiënt <i>wel eens</i> een hogere dosis medicatie gegeven dan de richtlijn aangeeft, met het doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen?	Total	
	Percentage	Number
Ja	10%	83
Nee	89%	701
Dat wil ik niet zeggen	1%	7
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

Was u in voorkomende gevallen zelf aanwezig bij de start van de palliatieve sedatie?	Total	
	Percentage	Number
Altijd	69%	545
Meestal wel	26%	202
Meestal niet	5%	36
Nooit	1%	8
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>791</b>

Heeft u een patiënt in een palliatieve situatie <i>wel eens </i> acuut moeten sederen?	Total	
	Percentage	Number
Ja	43%	375
Nee	56%	489
Wil ik niet zeggen	0%	2
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

Welk(e) middel(en) heeft u daarbij gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)	Total	
	Percentage	Number
Midazolam (Dormicum®)	92%	344
Levomepromazine (Nozinan®)	10%	37
Diazepam (Valium®)	6%	24
Lorazepam (Temesta®)	1%	3
Clonazepam (Rivotril®)	1%	3
Propofol (Diprivan®)	0%	1
Morfine	47%	178
Niet van toepassing	0%	1
Anders, namelijk	2%	7
<b>Total</b>	<b>159%</b>	<b>598</b>

Kent u de inhoud van de richtlijn Palliatieve sedatie van de KNMG?	Total	
	Percentage	Number
Ja	94%	816
Nee	6%	50
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

Vindt u dat deze richtlijn aansluit op de praktijk?	Total	
	Percentage	Number
Ja	84%	727
Nee	6%	49
Dat weet ik niet	10%	90
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

	Total	
Bent u wel eens te rade gegaan bij een palliatief consulent of team?	Percentage	Number
Ja	88%	762
Nee	11%	98
Weet niet/geen mening	1%	6
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

	Total	
Vindt u dat een consultatie bij een palliatief consulent of team verplicht zou moeten zijn?	Percentage	Number
Ja	9%	75
Nee	87%	751
Weet niet/geen mening	5%	40
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

	Total	
Zult u door de gebeurtenissen in Tuitjenhorn terughoudender worden in het toepassen van palliatieve sedatie?	Percentage	Number
Ja	4%	32
Nee	91%	786
Weet niet	6%	48
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>

	Total	
Bent u:	Percentage	Number
man	55%	472
vrouw	45%	394
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>866</b>